Dėl Jūsų pačių saugumo:

- Palikite namuose elektronikos prietaisus kaip: arbatinukas, kaitinimo elementai, televizoriai;
- Nesivežkite aštrių daiktų: peiliai, žirklės;
- Namuose palikite banko korteles, pinigus bei kitus brangius daiktus.

Rekomendacijos:

- Su savimi turėkite tik būtiniausius daiktus, telpančius į du rankinio bagažo vienetus. Nepamirškite asmens higienos priemonių (muilas, šukos, dantų pasta bei šepetėlis ir kt.);
- Jei pageidausite skyriuje dėvėti savo drabužius, atsivežkite juos švarius;
- Operacijos dieną rankų nagai turi būti nelakuoti;
- ADC ir Skubios pagalbos skyriaus pirmajame aukšte galite rasti bendro naudojimo neįgaliųjų vežimėlių, kuriais galite pasinaudoti (po to vežimėlį grąžinant atgal).

Į operacinę vykstant privaloma:

- Nusiimti papuošalus (auskarus, pakabukus ir kt.), išsiimti dantų protezus (jeigu juos nešiojate).

Pacientų lankymas
11:00 - 13:00 val. ir 16:00 - 19:00

KAUNO KLINIKOS

Svarbu! Po klubo ar kelio sąnario endoprotezavimo operacijos reabilitacija pradedama iš karto po stacionarinio gydymo. Prieš atvykstant operacijai **BŪTINA** iš anksto užsirezervuoti vietą pasirinktoje reabilitacijos įstaigoje.

Jeigu turite klausimų ar pasikeitė savijauta, negalite atvykti numatytu laiku, susisiekite su mumis telefonu:
Atvejo vadybininkės tel. nr.:
+37037326282

Reabilitacijos įstaigų kontaktai

Aktuali informacija

Kur mus rasti?

Ką pacientui būtina žinoti apie anesteziją?

Įvertinkite mūsų paslaugas

AČIŪ, KAD RENKATĖS MUS

WWW.KAUNOKLINIKOS.LT

KAUNO KLINIKOS

Planinio guldymo į LSMU Kauno klinikų Ortopedijos traumatologijos kliniką

KLUBO ARBA KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAVIMUI

PACIENTO ATMINTINĖ

Korpusas

D

Ambulatorinis diagnostikos centras ADC

(Eivenių g. 2, Kaunas)

Ortopedijos traumatologijos klinika

_____

Paciento vardas, pavardė

_____

Stacionarizavimo data

_____

Operacijos data

_____

Planuojamo išleidimo data (reabilitacijos pradžios)

_____

Gydytojo vardas, pavardė

Guldymo dieną atvykite **07:00** į **Ambulatorinį diagnostikos centrą** (ADC), korpusas **D** (įvažiavimas iš Lukšos - Daumanto g. pusės). Eikite tiesiai prie **108 kabineto**.

⇒ Jeigu atvykstate viešuoju transportu, šalia ADC, yra viešojo transporto stotelė pavadinimu "Skubios pagalbos centras".

Informacija apie galimybę naudotis mokamomis paslaugomis Ortopedijos traumatologijos klinikoje (pvz. mokama palata, maitinimas, laikino apgyvendinimo paslaugos* ir kt.) teikia skyriaus Vyr. slaugytoja - slaugos administratorė.

*-Ši paslauga skirta pacientams, norintiems anksčiau atvykti planinei operacijai ar stacionarizacijai arba po gydymo pageidaujantiems pratęsti buvimą ligoninėje.

Daugiau informacijos apie stacionarines, nemedicinines paslaugas teirautis
tel.: +37037326728

KAUNO KLINIKOS

Atvykę BŪTINAI turėkite su savimi:

- Elektroninį šeimos gydytojo siuntimą ortopedui traumatologui (Siuntime turi būti nurodytos pagridinių ir gretutinių ligų diagnozės);
- Asmens dokumentą;
- Atliktus paskirtų tyrimų rezultatus, ne senesnius nei 10 d. iki operacijos (elektroninius arba popierinius):
  - bendro kraujo tyrimo rezultatą;
  - kraujo krešumo tyrimų (SPA, INR, DATL) rezultatus;
  - biocheminių kraujo tyrimų rezultatus (kalio, natrio, šlapalo, kreatinino, gliukozės, CRB);
  - šlapimo tyrimo rezultatą;
  - kitų tyrimų, kuriuos galimai paskyrė gydytojas rezultatus;
  - atliktą elektrokardiogramą.
- Odontologo išrašą, kuriame nurodyta, kad burnos ertmėje nėra aktyvių infekcinių židinių;
- Magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos ar rentgeno nuotraukų vaizdus (jeigu jie atlikti ne Kauno klinikose);
- Vaistus (originaliose pakuotėse), kuriuos nuolat vartojate.

Medikamentų vartojimas iki operacijos:

- Savaitę iki operacijos nevartokite didelių maisto papildų dozių, česnako preparatų;

⇒ Jeigu vartojate vieną iš lentelėje nurodytų kraują skystinančių vaistų, prieš operaciją jo vartojimą **BŪTINA** suderinti su šeimos gydytoju*.

*- lentelėje pateiktos kraują skystinančių vaistų nutraukimo prieš operaciją rekomendacijos.

Kraują skystinantis vaistas	Kada išgerti paskutinę dozę prieš operaciją?
Xarelto (rivaroksabanas) 10 mg 1 k./d. **arba** 2,5 mg 2 k./d.	Likus 24 val. iki operacijos
Xarelto (rivaroksabanas) 20 mg 1 k./d. **arba** 15 mg 1-2 k./d.	Likus 72 val. iki operacijos
Eliquis (apiksabanas) 2,5 mg 2 k./d.	Likus 36 val. iki operacijos
Eliquis (apiksabanas) 5 mg 2 k./d.	Likus 72 val. iki operacijos
Lixiana (edoksabanas) 30–60 mg	Likus 72 val. iki operacijos
Pradaxa (dabigatranas) *Nepriklausomai nuo dozės*	Likus 72 val. iki operacijos
Aspirinas *Kaip paskyrė gydytojas*	Nutraukti nereikia—vartokite įprastai

Medikamentų vartojimas ir mityba operacijos dienos rytą:

- Vaistus, kuriuos nurodė tęsti gydantis gydytojas, išgerkite užsigerdami nedideliu kiekiu vandens likus ne mažiau kaip 2 val. iki planuojamos operacijos su anestezija (jei sergate cukriniu diabetu ar turite ženklų viršsvorį – ne mažiau kaip prieš 3 val.).
- **6 val.** iki operacijos nevalgykite ir negerkite neskaidrių skysčių.

Bendras pasiruošimas gulantis į Ortopedijos traumatologijos kliniką

Dieną prieš operaciją nevartokite alkoholio, venkite gazuotų gėrimų.

Operacijos išvakarėse:

- valgykite tik lengvą vakarienę, daugiau gerkite skysčių;
- išsimaudykite po dušu;
- netepkite kūno kremais;
- operuojamoje vietoje nešalinkite plaukų, nes galite pažeisti odos vientisumą bei padidinti infekcijos riziką.